

Aktuelle N_{min} - Werte 2016 in verschiedenen Regionen im Beratungsbezirk des DLR Eifel

Prüm/Daun		Nmin in kg/ha in der Bodenschicht			Ertrag	Düngeempfehlung in kg N/ha		
Hauptfrucht	Vorfrucht	0 - 30 cm	30 - 60 cm	0 - 60 cm	dt/ha	1. Gabe	2. Gabe	3. Gabe
Winterraps	Getreide	20	10	30	40	85 - 95	95 - 95	
Getreide	Blattfrucht	18	19	37	75	50 - 60	70 - 75	70 - 75
Getreide	Getreide	17	12	29	70	50 - 60	65 - 70	65 - 70
Hunsrück/Hochwald		Nmin in kg/ha in der Bodenschicht			Ertrag	Düngeempfehlung in kg N/ha		
Hauptfrucht	Vorfrucht	0 - 30 cm	30 - 60 cm	0 - 60 cm	dt/ha	1. Gabe	2. Gabe	3. Gabe
Winterraps	Getreide	30	14	44	40	80-85	80-85	—
Getreide	Blattfrucht	53	24	77	75	35 - 45	60 - 65	60 - 65
Getreide	Getreide	40	24	64	70	35-40	60 - 70	60 - 70
Saargau/Wittlich		Nmin in kg/ha in der Bodenschicht			Ertrag	Düngeempfehlung in kg N/ha		
Hauptfrucht	Vorfrucht	0 - 30 cm	30 - 60 cm	0 - 60 cm	dt/ha	1. Gabe	2. Gabe	3. Gabe
Winterraps	Getreide	20	10	30	45	90 - 100	90 - 100	—
Getreide	Blattfrucht	14	21	35	80	50 - 60	70 - 80	70 - 80
Getreide	Getreide	25	20	45	75	45 - 55	65- 75	65 - 75
Bitburg		Nmin in kg/ha in der Bodenschicht			Ertrag	Düngeempfehlung in kg N/ha		
Hauptfrucht	Vorfrucht	0 - 30 cm	30 - 60 cm	0 - 60 cm	dt/ha	1. Gabe	2. Gabe	3. Gabe
Winterraps	Getreide	21	20	41	45	85 - 95	85-95	—
Getreide	Blattfrucht	17	17	34	80	50 - 60	70- 80	70 - 80
Getreide	Getreide	24	22	46	75	45 - 55	65 - 75	65 - 75

Probenahme: 25.01. - 11.02.2016

Die aus den Nmin - Werten abgeleiteten Düngempfehlungen gelten lt. DüVo als Orientierungswerte und sind je nach Stand der Kultur, Sorte, Bodenart, langjähriger org. Düngung sowie einzelbetrieblicher Ertragserwartung und dem Qualitätsziel anzupassen; d.h. es können Zu- und/oder Abschläge bei den einzelnen Düngergaben erforderlich sein. Für die Qualitätsdüngung bei Weizen sind zusätzlich 30 kg N/ha zu düngen.